

Calendrier des Vaccinations

Selon les recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France

- Dès le 1^{er} mois** **BCG intradermique**
Fortement recommandé chez les enfants à risque élevé de tuberculose.
Indication à voir avec votre médecin de famille.
- A 2 mois** **Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B**
Infanrix hexa
+ **Vaccin pneumococcique 13-valent conjugué**
Prévenar 13
- A 3 mois** **Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche, Haemophilus influenzae b**
Pentavac, Infanrix quinta
- A 4 mois** **Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B**
Infanrix hexa
+ **Vaccin pneumococcique 13-valent conjugué**
Prévenar 13
- A 12 mois** **Vaccin pneumococcique 13-valent conjugué**
Prévenar 13
- A 12 mois (ou à partir de 9 mois si entrée en collectivité ou voyage en pays étranger)**
Rougeole, Oreillons, Rubéole
RORvax, Priorix, MMR vax pro (1^{ère} dose)
- Au moins un mois après la première dose et avant 24 mois :**
Rougeole, Oreillons, Rubéole
RORvax, Priorix, MMR vax pro (2^{ème} dose)
- De 12 mois à 24 ans** **Vaccin Méningocoque C conjugué (1 dose)**
- De 16 à 18 mois** **Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B**
Infanrix hexa
- A 6 ans** **Diphtérie, Tétanos, Polio (2^{ème} rappel)**
DTPolio
- De 11 à 13 ans** **Diphtérie, Tétanos, Polio (3^{ème} rappel), Coqueluche (2^{ème} rappel)**
Tétravac, Infanrix tétra
- A 14 ans** **Vaccination contre les infections à Papillomavirus** recommandée pour les jeunes filles
Cervarix, Gardasil
- De 16 à 18 ans** **Diphtérie, Tétanos, Polio (4^{ème} rappel) Revaxis (dose réduite d'anatoxine diphtérique)**
+ **Coqueluche (2^{ème} rappel si non effectué entre 11 et 13 ans)**
Repevax, Boostrix tetra
- De 26 à 28 ans** **Diphtérie, Tétanos, Polio (5^{ème} rappel) Revaxis**
+ **Coqueluche (2^{ème} rappel si non effectué entre 11 et 13 ans ou 16 et 18 ans)**
Repevax, Boostrix tetra
- Pour les personnes nées en 1980 et depuis** non vaccinées contre la Rougeole
Rougeole, Oreillons, Rubéole : 2 doses
RORvax, Priorix, MMR vax pro
- > 28 ans** **Diphtérie, Tétanos, Polio : Tous les 10 ans**
Revaxis
+ **Coqueluche (2^{ème} rappel si non effectué entre 11 et 13 ans ou 16 et 18 ans)**
Repevax, Boostrix tetra
Rubéole : Pour les jeunes femmes non vaccinées en âge de procréer.
Rudivax
- A partir de 65 ans** **Grippe**
Tous les ans

Pour toute question, appeler le 02 51 44 21 95